



GDON du Libournais
BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion
Email : animateur@gdon-libournais.fr
Tel : 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 13

Le 26 juin 2025

Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le [BSV n°13 du 24 juin 2025](#)

Les estimations des niveaux de pression et de risques présentées dans ce bulletin sont établies sur la base de réseaux d'observation menés dans le cadre de protocoles standardisés. Ces données sont analysées par des techniciens spécialisés en épidémiologie-surveillance. Les résultats diffusés représentent une tendance générale de la situation au vignoble. Elle ne peut se substituer à une analyse des risques individuelle et nécessite d'être adaptée aux spécificités de chaque parcellaire.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec Vitivista et Phloème. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort et Géosens. Les données météorologiques proviennent des réseaux Weenat et Sencrop, elles sont gracieusement mises à disposition par des châteaux du secteur et le prestataire Aquitaine Viti Service.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Phénologie	Stade moyen « grains de 5 – 6 mm », fermeture de la grappe imminente
Mildiou	Risque faible jusqu'au 02 juillet
Black-rot	Risque faible jusqu'au 02 juillet
Oïdium	Risque faible, très légère évolution des symptômes en placettes non traitées
Eudémis	2 ^{ème} vol en cours, faible niveau de pontes observé. Période d'intervention optimale si nécessaire
Flavescence Dorée	Fin des stades larvaires et premiers adultes, pose du réseau de pièges 2025 en cours

SYNTHESE METEOROLOGIQUE


SYNTHESE METEO DE LA PERIODE du 19 au 25 juin 2025

	Températures			Pluviométrie (cumul)
	Minimales	Maximales	Moyennes	
Valeurs extrêmes sur le territoire (min/ max)	11,5°C / 20,5°C	27,8 / 39,5°C	23,6 / 25,8°C	0 / 3,4 mm
Moyenne de la semaine	16,8°C	33°C	24,9°C	0,8 mm

Tableau 1 : Données météorologiques : du 19 au 25 juin, source Sencrop (46 points) et Weenat (15 points)

La semaine écoulée est marquée par des épisodes de fortes chaleurs. Le samedi 21 juin est le jour le plus chaud avec des maximales autour de 36,5°C en moyenne, alors que la journée la plus fraîche a été le dimanche 22 juin (28,8°C en moyenne). Les T°C maximales sont ensuite remontées au-dessus de 32°C. Dans le même temps, les minimales se sont maintenues entre 15 et 19°C. La T°C moyenne hebdomadaire est de 24,9°C, supérieure de 2,6°C à celle de la semaine précédente.

Les épisodes orageux provoqués par ces fortes chaleurs à l'échelle nationale ont épargné le territoire du GDON du Libournais où seules de faibles pluies ont été enregistrées dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 juin. Les cumuls associés varient de 0 à 3,4 mm, pour une moyenne de 0,8 mm (les précipitations survenues après minuit sont associées au 26 juin et seront prises en compte la semaine prochaine).



Carte 1 : Pluviométrie cumulée du 19 au 25 juin 2025, sources : Sencrop (46 stations), Weenat (15 points)

Météo prévisionnelle (OADEX, Météociel, Météo Blue, Weenat) : du 26 juin au 02 juillet

La période de fortes chaleurs va se prolonger toute la semaine. Le jeudi 26 juin est annoncé comme la journée la plus fraîche, avec des T°C atteignant tout de même 30°C. Les maximales remonteront ensuite pour atteindre 37°C le lundi 30 juin. Les minimales varieront entre 16 et 21°C.

Quelques averses (< 1 mm) sont encore prévues ce jeudi 26 juin. Le reste de la semaine sera sec, les prochaines averses n'étant pas attendues avant jeudi 03 juillet.



Phénologie au vignoble


Les observations ont été réalisées le lundi 23 juin. Le stade moyen observé est « grains de 5 – 6 mm ». Les parcelles les plus tardives se situent au stade « grains de 3 – 4 mm » alors que les plus précoces débutent la fermeture de la grappe. La phénologie des grappes évolue rapidement sous les conditions actuelles et la fermeture de la grappe se généralise au vignoble en cette fin de semaine.



Flavescence Dorée

Suivi des populations larvaires

Les insectes se développent rapidement sous les conditions de chaleurs actuelles et le stade majoritaire est désormais le stade L5. Les premiers adultes sont très probablement présents au vignoble. Les populations larvaires diminuent et les stades larvaires âgés sont plus mobiles, les larves sont donc plus difficilement observables.



Graphique 1 : évolution des stades larvaires de CFD, année 2025

Suivi des efficacités des traitements larvaires

L'équipe du GDON du Libournais a débuté la pose des pièges jaunes du réseau 2025. Il servira à évaluer l'efficacité des traitements obligatoires et la nécessité de les renouveler dans les zones concernées. Ces pièges sont pour l'instant inactifs (pas de plaque engluée), les piégeages débuteront en semaine 29 (lundi 14 juillet).



Observation des ravageurs

Bilan glomérule

L'observation des glomérules est un indicateur pertinent pour évaluer les pressions en vers de grappe du début de saison. Le bilan des observations réalisées par le GDON est à retrouver dans le [bulletin n°10 du 05 juin](#) ou sur notre site internet en cliquant [ici](#).

Suivi du 2^{ème} vol

Le 2^{ème} vol se poursuit sur les secteurs précoces du territoire (Pomerol, Lalande, Libourne, Saint Sulpice de Faleyrens, Vignonet, Saint Pey, sud des Côtes de Castillon) et a désormais débuté sur le reste de la zone. Cette semaine, 7 des 11 pièges alimentaires présentent au moins une capture, pour une moyenne de 6,4 individus / piège / semaine (max = 28 papillons). 35 des 57 pièges sexuels ont également capté au moins un papillon, pour une moyenne de 1,9 (max = 13). La carte des vols est disponible sur notre [site](#).

Suivi de pontes

La première ponte a été signalée **le lundi 16 juin** à Libourne (source Phloème) et confirmée le mercredi 18, toujours à Libourne. Sur ces secteurs précoces, l'évolution des œufs a été très rapide et des perforations sont désormais visibles. Des pontes sont toujours en cours et peuvent être observées dans les secteurs précoces à médian (Libourne, Saint Magne de Castillon, Saint Philippe D'Aiguilhe, Saint Sulpice de Faleyrens, Vignonet...), sources Phloème et le GDON du Libournais. Sur les secteurs plus tardifs, les premières pontes devraient faire leur apparition en début de semaine prochaine

Les pressions observées sont faibles pour l'instant, plus de 80 % des parcelles ne présentent aucune ponte et les niveaux de pressions sur les sites concernés sont inférieurs à 5 %. Seules deux parcelles historiquement sensibles, situées à Libourne, sont plus fortement impactées.

Effet des canicules sur les pressions eudémis

Les fortes chaleurs en cours devraient perturber le cycle des Eudémis. Elles peuvent accélérer le développement des pontes, réduisant le temps de latence entre dépose de la ponte et l'émergence de la larve et nécessitant de positionner des traitements ovicides au plus proche du départ des vols si un traitement s'avère nécessaire.

Toutefois, les conditions caniculaires pourront également affecter la survie des œufs, voire dans des T°C exceptionnelles celle du vol des papillons. Le taux d'hygrométrie est le paramètre principal de la survie des pontes, le climat pouvant jouer le rôle d'insecticide naturel par dessiccation des œufs en cas de maintien d'un taux d'hygrométrie inférieur à 60 % pendant plusieurs jours.

Stratégie de protection à suivre

Seul un suivi régulier des pontes dans les prochains jours permettra d'évaluer les pressions réelles de tordeuses résultantes de cette 2^{ème} génération. Les vignerons ayant décidé de positionner une intervention insecticide ciblant la G2 doivent intervenir dès maintenant sur les secteurs précoces et médians. Sur le secteur plus tardif du territoire (Les Artigues de Lussac, Lussac, Puisseguin, appellation Côtes de Francs), la période optimale d'intervention devrait se situer en fin de semaine (début juillet).

Cependant, les observations réalisées démontrent une pression globalement faible de la 2^{ème} génération d'Eudémis. Il est donc nécessaire de confirmer la présence régulière de pontes avant toute décision d'intervention phytosanitaire.

Cicadelles vertes : suivi des populations

Les populations d'adultes de la cicadelle verte captées dans les pièges sont toujours en augmentation cette semaine, traduisant que le 2^{ème} vol de l'insecte est en cours. Les populations larvaires de 2^{ème} génération sont désormais présentes dans les parcelles et devraient augmenter dans les jours à venir. Les parcelles sensibles au risque de grillure doivent désormais faire l'objet d'un suivi régulier.



Maladies Cryptogamiques

DATE D'OBSERVATION DES TEMOINS NON TRAITES (TNT) : Le 23 juin 2025

Mildiou : risque faible sous les conditions à venir,

Black-rot : risque faible sous les conditions à venir,

Oïdium : risque faible, protection recommandée jusqu'au stade fermeture de la grappe.

DETAIL DES RISQUES CRYPTOGRAMIQUES PAR THEMATIQUE

Période du 26 juin au 02 juillet

MILDIOU

Contaminations détectées par les modèles	Période du 13 - 15 juin : les conséquences de cet épisode orageux sont visibles au vignoble sur feuilles depuis le 23 juin et en cours d'apparition sur grappes.
Contaminations prévues par les modèles	Les modèles n'enregistrent plus de contaminations primaires, ni secondaires jusqu'au 02 juillet.
Symptômes détectés au vignoble	Dans les placettes non traitées : les pluies du 13 au 15 juin ont entraîné une forte progression de la pression foliaire de mildiou (passant de 15 à 24 % de feuilles touchées), avec des symptômes non sporulant sous les conditions de sécheresse. Les dégâts sur grappes n'étaient pas encore visibles au 23 juin. Dans le vignoble traité : les pluies du 13 au 15 juin ont entraîné l'apparition de nouvelles taches foliaires de mildiou dans environ la moitié des parcelles suivies, mais de façon très anecdotique dans la plupart des situations. 5 à 10 % des parcelles montrent des symptômes foliaires plus réguliers à surveiller plus étroitement. Aucune parcelle traitée ne montrait d'évolution de la pression sur grappes mais des incubations étaient encore potentiellement en cours.
Conclusion	L'état sanitaire du vignoble du Libournais est globalement très sain. La météo prévisionnelle est caniculaire jusqu'au 02 juillet, associée à de faibles hygrométries et humectations. Le risque de contamination ou de repiquage est extrêmement faible (voire nul), la protection phytosanitaire peut être pour l'instant reportée sauf si survenue d'un événement orageux.

BLACK-ROT

Stade sensibilité	La sensibilité des grappes est désormais plus faible et deviendra quasiment nulle à la fermeture définitive en cas d'absence de symptôme visible dans la parcelle.
Contaminations détectées par les modèles	Période du 30 mai au 10 juin : les symptômes de black-rot sont désormais visibles au vignoble. Pluies du 13 au 15 juin : les symptômes sont sur le point d'apparaître sur feuilles et ne sont pas encore visible au vignoble.
Contaminations à venir	Aucune contamination modélisée jusqu'au 02 juillet.
Symptômes détectés	Sur Témoins Non Traités : les nouvelles taches issues de la période du 1^{er} au 10 juin sont diluées dans la pousse de la végétation et aucune progression significative n'est observée à l'exception de 2 placettes très touchées par la maladie en début de saison. La progression sur grappes est faible mais les conséquences des pluies du 13 - 15 juin n'étaient pas encore visibles. Sur le vignoble traité : le vignoble est sain. Seules 5 % des parcelles présentent de nouvelles taches foliaires, aucune parcelle ne montre de symptômes significatifs sur grappes.

Conclusion	Les conditions de T°C et d'humectation prévues jusqu'au 02 juillet sont particulièrement défavorables à la maladie dans un vignoble globalement sain et sur des grappes de moins en moins sensibles. La protection phytosanitaire peut être reportée sauf si survenue d'un événement orageux.
-------------------	---

OÏDIUM

Stade de sensibilité	Le stade de sensibilité maximal des grappes est désormais terminé mais elles restent sensibles jusqu'à leur fermeture définitive.
Symptômes détectés	Sur Témoins Non Traités : les premiers symptômes d'oïdium sont détectés plus régulièrement cette semaine avec 5 sites présentant au moins 1 symptôme contre 2 la semaine dernière et 1 seul au 10 juin. Toutefois, la présence de la maladie est très anecdotique (de l'ordre de 1 %) et ne montre quasiment pas d'évolution sur les 2 sites déjà touchées. Sur le vignoble traité : aucune observation d'oïdium recensée.
Evaluation du risque dans les jours à suivre	Les conditions climatiques restent peu favorables à l'oïdium ces prochains jours en raison des fortes températures et de la faible hygrométrie actuelle. Les méthodes de lutttes prophylactiques (effeuillage, rognage...) peuvent être mises en place afin de limiter la propagation de la maladie. En effet, la croissance de la végétation crée des zones d'ombres qui permettent au champignon de se développer.
Conclusion	Le risque oïdium est toujours présent mais la progression de la maladie est fortement ralentie du fait des conditions climatiques et de la moindre sensibilité des grappes pour les parcelles les plus précoces. Il est recommandé de maintenir une protection jusqu'au stade de fermeture définitive et complète de la grappe.

Prochain bulletin : le 03 juillet 2025

L'équipe du GDON du Libournais