



GDON du Libournais
BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion
Email : animateur@gdon-libournais.fr
Tel : 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 16

Le 09 juillet 2026

Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le BSV [n°15 du 07-07-2026](#)

Les estimations des niveaux de pression et de risques présentées dans ce bulletin sont établies sur la base de réseaux d'observation menés dans le cadre de protocoles standardisés. Ces données sont analysées par des techniciens spécialisés en épidémiologie-surveillance. Les résultats diffusés représentent une tendance générale de la situation au vignoble. Elle ne peut se substituer à une analyse des risques individuelle et nécessite d'être adaptée aux spécificités de chaque parcellaire.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec Vitivista et Phloème. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort et Géosens. Les données météorologiques proviennent des réseaux Demeter 33 et Sencrop, elles sont gracieusement mises à disposition par des châteaux du secteur et le prestataire Aquitaine Viti Service.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Phénologie	Stade moyen « Fermeture de la grappe », les 1ères baies vérées se généralisent
Mildiou	Risque nul en absence de pluie
Oïdium	Fin de protection sur les parcelles indemnes
Black rot	Fin de protection sur les parcelles indemnes
Vers de grappes	Faible pression de G2, bilan des perforations en cours

SYNTHESE METEOROLOGIQUE

SYNTHESE METEO DE LA PERIODE du 02 au 08 juillet 2026

	Températures			Pluviométrie (cumul)
	Minimales	Maximales	Moyennes	
Valeurs extrêmes sur le territoire (min/ max)	8,7 / 22°C	28,9 / 41,5°C	24 / 26,9°C	0 mm
Moyenne de la semaine	15,3°C	35,2°C	26,1°C	0 mm

Tableau 1 : Données météorologiques : du 02 au 08 juillet, sources Sencrop (40 stations) et Weenat (15 points)

La semaine s'est déroulée sous des conditions estivales à caniculaires. Les minimales se sont maintenues entre 13 et 17°C jusqu'au dimanche 05 juillet, où certaines stations enregistrent des valeurs sous les 10°C. La maximale la plus fraîche de la semaine (28,9°C) est relevée le jeudi 02 juillet (29,8°C en moyenne), avant une remontée progressive jusqu'au lundi 06 (38,7°C). Un épisode de fortes chaleurs (min. > 15°C et max. > 37°C) est toujours en cours depuis cette date. Aucune pluie n'est relevée cette semaine.

Météo prévisionnelle (sources OADEx. Météociel. Météo Blue, Weenat) : du 09 au 15 juillet 2026

Les T°C attendues restent caniculaires jusqu'au dimanche 12 voire lundi 13 selon les modèles, avec des minimales comprises entre 18 et 23°C et des maximales supérieures à 38°C et pouvant atteindre 42°C. Un rafraîchissement très relatif est ensuite prévu, avec des minimales autour de 19°C et des maximales autour de 35°C.

Une pluie légère (2,4 mm) est annoncée dans la soirée du vendredi 10 juillet par le modèle Météociel, sans évènement orageux. Le modèle de Meteoblue détecte un orage dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet, avec un cumul variant entre 0 et 10 mm. Cet épisode n'est pas confirmé par les autres modèles, qui n'enregistrent que des averses non significatives (< 1 mm) dispatchées sur la semaine.



Phénologie au vignoble

La fermeture de la grappe est désormais réalisée sur la totalité du vignoble. De manière générale, les premières baies vérees sont régulièrement présentes. Des dégâts de brûlures sur feuilles liées aux fortes chaleurs sont observés. Certaines vignes situées sur des sols plus drainant (sable, graves...) présentent également des premiers symptômes de stress hydrique. Ces conditions climatiques freinent par endroit la progression de la véraison.



Observation des ravageurs

VOL D'EUDEMIS

Suivi des vols :

Eudémis : Le 2ème vol est désormais terminé. Il a eu lieu entre le 04 et le 25 juin 2026, avec un pic d'activité situé entre le 11 et le 18 juin. Les captures sont toutefois restées très faibles, ne permettant pas d'évaluer des secteurs de pressions différenciées à partir du réseau de pièges.

Suivi des perforations :

La fin du vol marque la période optimale pour observer la pression de G2 sur le parcellaire. Un bilan de perforations est en cours et sera complété la semaine prochaine. Les observations sont réalisées sur 50 grappes choisies aléatoirement par site. Sur les 60 parcelles déjà suivies,

la pression moyenne est de 3 %, proche des valeurs de 2021 (2 %) et parmi les plus faibles historiquement.

De fortes hétérogénéités entre parcelles sont constatées, 22 sites ne présentent aucune perforation alors que 7 parcelles dépassent le seuil de 10 % de grappes touchées, considéré comme le seuil de décision pour une intervention en 3^e génération. Elles sont situées sur les communes des Artigues de Lussac, Lalande de Pomerol, Libourne (x2), Lussac (x2) et Montagne.

	0 grappe perforée	<= 10 grappes perforées	10 à 25 grappes perforées	> 25 grappes perforées
Nb de parcelles	22 (36 %)	31 (52 %)	7 (12 %)	0 (0 %)
Moyenne de perforations (en %)	0	3	13	0

Tableau 2 : bilan 2026 des perforations de G2

Pour les parcelles concernées par les pressions importantes, il est trop tard pour intervenir sur cette génération, les traitements phytosanitaires devront cibler les pontes de la G3. Leur présence devra être confirmée par observation des parcelles.



Flavescence Dorée

Suivi des efficacités des traitements larvaires

Les pièges jaunes utilisés pour la surveillance des populations adultes de cicadelles de la flavescence dorée sont désormais posés et seront relevés à fréquence hebdomadaire entre le 13 juillet et le 05 août 2026 dans les 31 zones soumises à traitements obligatoires en 2026.

La décision de renouvellement de traitement dans les zones concernées sera donc connue le 05 août 2026, sur la base des relevés effectués.

Certains pièges jaunes sont volontairement placés dans des parcelles sans obligation de traitement, afin de connaître l'évolution des niveaux de population de l'insecte dans des zones non traitées depuis de nombreuses années. Dans ce dernier cas, les résultats de piégeage ne peuvent pas entraîner de demande de mise en place en traitement et servent d'indicateur dans notre plan de gestion pluriannuel.



Maladies Cryptogamiques

DATE D'OBSERVATION DES TEMOINS NON TRAITES (TNT) : Le 06 juillet 2026

Mildiou : Risque nul en absence de pluie, à réévaluer en cas de changement de prévisions météo

Black rot et Oïdium : Fin de protection sur les parcelles indemnes ayant atteint le stade fermeture de la grappe

DETAIL DES RISQUES CRYPTOGRAMIQUES PAR THEMATIQUE

Période du 09 au 15 juillet 2026

MILДИОU

Déroulement de l'épidémie 2026	1 ^{ère} contaminations le 11 avril puis généralisation des symptômes foliaires suite aux pluies du 29 avril – 07 mai. Les différents épisodes pluvieux suivant se sont montrés peu contaminants.
Contaminations déjà détectées par les modèles	Les dernières contaminations détectées par les modèles sont issues des pluies du 28 juin, sous des conditions de pluviométries importantes (> 20 mm). Les symptômes qui en découlent sont visibles depuis le 03 juillet. Ils restent rares à inexistant au vignoble.
Contaminations prévues par les modèles	Aucune contamination n'est détectée sous les prévisions météo sèches à venir.
Symptômes détectés au vignoble	Dans les Témoins non traités : l'évolution de la maladie est très limitée cette semaine (< 1 % en moyenne). Seule une des 15 placettes présente une augmentation modérée des symptômes, passant de 20 à 28 % des grappes touchées avec des dégâts augmentant de 2,5 à 4 %. Dans le vignoble traité : l'état sanitaire est bon sur la quasi-totalité du vignoble.
Conclusion	Le maintien d'une période chaude, voire caniculaire, couplé à de faibles hygrométries et à une présence de vent régulière est défavorable à l'évolution du mildiou. De plus, le début de la véraison marque la baisse de la sensibilité des baies. En absence de pluie, le renouvellement de la protection n'est pas nécessaire à ce jour. Une réévaluation du risque mildiou devra être réalisée en amont des prochaines pluies. Sur les parcelles en cours de véraison, la protection pourra se concentrer sur le maintien d'un feuillage fonctionnel, avec des interventions à base de produits de contact uniquement.

BLACK-ROT

La sensibilité de la vigne à la maladie est en nette diminution après la fermeture de la grappe et la généralisation de la véraison. Les baies ne seront plus sensibles à l'approche du prochain épisode contaminant. La protection spécifique contre le black rot doit désormais être stoppée.

OÏDIUM

Déroulement de l'épidémie 2026	Symptômes anecdotiques jusqu'au 22 juin puis progression de la présence d'oïdium dans les Témoins Non Traités recensée le 29 juin : un tiers des placettes concernées, avec un faible niveau de pression. Présence de symptômes rares dans le parcellaire traité.
Stade de sensibilité	La fermeture complète des grappes marque la fin de la sensibilité des baies à la maladie à condition que le champignon soit parfaitement absent au moment de la fermeture. En cas de présence du champignon sur baies, il est conseillé de maintenir une protection jusqu'à véraison bien enclenchée. En l'absence de protection, les feuilles resteront réceptives à la maladie et pourront extérioriser des symptômes jusqu'au début de l'automne mais, contrairement au mildiou, les attaques foliaires de fin de saison sont considérées comme un facteur très secondaire dans l'établissement du risque épidémique de l'année suivante. Sauf problématique récurrente entre années, il n'est donc pas nécessaire de gérer l'oïdium foliaire de fin de saison.
Suivi aérien des réseaux de sporée	L'activité aérienne est en légère baisse cette semaine sur le territoire, 20 % des échantillons sont positif (source BSV n°15).
Symptômes détectés	Dans les TNT, 10 des 15 placettes sont toujours indemnes et 4 des 5 parcelles touchées ne présentent aucune évolution cette semaine. Seul le TNT le plus impacté montre une progression de la maladie, avec une fréquence d'attaques sur grappes passant de 13 à 20 % et une intensité de dégâts de 1 à 3 %. Le vignoble traité est très sain, seule une parcelle présentant des symptômes réguliers a été signalée sur le territoire du Libournais.
Evaluation du risque dans les jours à suivre	Les conditions chaudes à caniculaires et l'absence d'hygrométrie à venir restent défavorable à l'oïdium. De plus, les grappes indemnes de symptômes ayant atteint la fermeture de la grappe ne sont plus sensibles. Le risque à venir est nul sur parcelles indemnes.
Conclusion	Il est nécessaire de réaliser un état des lieux précis de la présence d'oïdium sur l'ensemble du parcellaire au moment de la fermeture de la grappe. Fin de protection en absence de symptômes sur grappes.

Prochain bulletin : le 16 juillet 2026

L'équipe du GDON du Libournais,